

منظمة Community Action Pioneer Valley وبرامج هيد ستارت والتعليم المبكر بروتوكولات كوفيد-19 اعتباراً من 15 فبراير / شباط 2022

إن مكتب برنامج هيد ستارت يلزم ببرامج هيد ستارت والتعليم المبكر باتباع أكثر اللوائح صرامة الصادرة عن وزارة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة (EEC)، ومكتب برنامج هيد ستارت، ومركز السيطرة على الأمراض (CDC). تُلبي بروتوكولات برامج هيد ستارت والتعليم المبكر أو تتجاوز الحد الأدنى من كافة المتطلبات والتوجيهات. يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية ببروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بالمنظمة والبرنامج واتباعها وكذلك جميع التغييرات التي تطرأ على هذه البروتوكولات فور حدوثها. نحن ملتزمون بوضع بروتوكولاتنا على أساس أفضل البيانات والتوجيهات المتاحة، وملتزمون كذلك بمتابعة ثقافتنا الخاصة بالصحة والسلامة.

جدول المحتويات

2	التغييرات في ممارساتنا اليومية
2	قبل دخول بيئة التعلم
2	التواصل والتوجيه
2	فحص ومراقبة الأطفال
2	فحص ومراقبة الموظفين
2	النقل
4	في بيئة التعلم
4	تقليل المخالطة بين المجموعات
4	الممارسات اليومية
4	خدمات الدعم المباشر والمتطوعون (IFSP / IEP) والأخصائيون والمتعاقدون ومقدمو الخدمات الخارجيون والمتطوعون
4	اللقاءات المتطلبات والاستثناءات للموظفين
4	معدات الحماية الشخصية وممارسات التنظيف لتقليل انتشار كوفيد-19
6	إعطاء الأدوية
7	عند إصابة أحد الأشخاص بالمرض
7	المرض المؤكد في المكان
9	عودة الموظفين إلى العمل
9	موارد برنامج HSELP الإضافية في حالة المرض (الموظفون/الأطفال)
10	حالات الإغلاق والإشعارات
10	حالات إغلاق البرنامج المتوقعة
10	الإشعارات وإشراك مجلس الصحة المحلي
11	الموارد

التغييرات في ممارساتنا اليومية

قبل دخول بيئة التعلم

التواصل والتوجيه

- سيستخدم المعلمون منهج كوفيد-19 الخاص بنا لتعريف الأطفال باستراتيجيات كوفيد-19 في البيئة، ولدعم الأطفال طوال الأسابيع الأولى من الرعاية لمساعدتهم على فهم وتنفيذ استراتيجيات كوفيد-19 بمرور الوقت.
- من خلال تطبيق منهج كوفيد-19 الخاص بنا، سيتعرف الأطفال على معدات الحماية الشخصية (PPE) ودور الجراثيم في أجسامنا. سيطبق المعلمون استراتيجيات تهدئة بسيطة للأطفال الصغار والتي يمكن تنفيذها، إلى أقصى حد ممكن، بشكل فردي مع الحفاظ على التباعد البدني عن الآخرين. سيقوم موظفو الخدمات الأسرية بالتعاون مع المعلمين بالاشتراك مع الأسر لتقديم جلسة توجيهية لفهم بروتوكولات كوفيد-19 الحالية (عبر الهاتف أو برنامج زوم (Zoom) أو بالحضور الشخصي).

فحص ومراقبة الأطفال

- خصص كل موقع موظفين مدربين على إجراء الفحوصات الصحية.
- ستكمل الأسرة الفحوصات الصحية اليومية، قبل دخول الأطفال إلى المبنى أو دخول الموظفين إلى المنزل لإجراء الزيارة المنزلية (يرجى الاطلاع على [بروتوكولات الخدمات المنزلية بالحضور الشخصي](#)).
- إذا لم يجتاز الطفل الفحص الصحي، سيخبر القائم بالفحص الأسرة بأنه لا يمكن للطفل حضور برنامج الرعاية في هذا اليوم. سينصح القائم بالفحص ولي الأمر بمراقبة مرض الطفل والاتصال بمقدم الرعاية الصحية للطفل من أجل اتخاذ الخطوات التالية.
- سيبلغ موظفو الموقع أخصائي الصحة عن جميع الأطفال الذين لم يجتازوا الفحص الصحي.
- يجب أن يكون جميع الأطفال بدون أي أعراض وحمى لمدة 24 ساعة دون تناول أدوية خافضة للحمى حتى يعودوا لبرنامج الرعاية وألا تظهر عليهم أعراض أخرى لكوفيد-19 (انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات)
- ستكون نماذج *الفحوصات الصحية اليومية* متاحة في الموقع لكل طفل.
- راجع مخطط الحجر الصحي والعزل للأطفال الذين تظهر عليهم أعراض أثناء وجودهم في برنامج الرعاية والذين لديهم موافقة موقعة من ولي الأمر لإجراء الفحص. (انظر أدناه)

فحص ومراقبة الموظفين

- سيتتبع جميع الموظفين بروتوكولات الفحص الخاصة بمنظمة CAPV وسيقومون بملء فحص صحي إلكتروني يوميًا سواء كانوا يعملون عن بُعد أو في الموقع. <https://www.surveygizmo.com/s3/5677024/Health-Screening-2020>
- إذا لم يجتاز أحد الموظفين الفحص الصحي الصباحي، سيبلغ مشرفه وإدارة الموارد البشرية لاتخاذ الخطوات التالية.
- سيتتبع الموظفون [بروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بمنظمة CAPV](#).

النقل

نقل الأطفال

- توافر النقل للأطفال محدود للغاية في الوقت الحالي.
- سيتم استخدام نظام أولويات النقل الخاص ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لتحديد الأطفال الأكثر احتياجًا للنقل

نموذج الفحص الصحي اليومي

- لن يتم نقل الأطفال الذين لم يجتازوا الفحص الصحي أو يبدو عليهم المرض بعد إجراء الفحص البصري في ذلك اليوم.
- قبل ركوب الحافلة، سيتحقق المراقب من أن كل طفل لديه نموذج فحص صحي يومي موقع (ستُعطى الأسر نسخًا فارغة من نموذج الفحص الصحي اليومي لتعبئتها قبل وصول الحافلة إلى المحطة).
- سيراجع المراقب النموذج ويتحقق من أن الطفل قد اجتاز الفحص.
- في حالة تعرض الطفل للمرض في الموقع، وبموافقة ولي الأمر، سيقوم ولي الأمر بإجراء فحص مستضد سريع في المنزل قبل وصول الحافلة وإظهار نتيجة الفحص السلبية لمراقب الحافلة قبل ركوب الحافلة.
- في حالة عدم تمكن الطفل الذي لا تظهر عليه أعراض من إجراء الفحص في المنزل ونقله إلى المدرسة، سيقوم أحد موظفي برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بإجراء الفحص للطفل بمجرد وصوله بموافقة ولي الأمر.

أغطية الوجه/ قاعدة ارتداء الجميع للكمامة (للحصول على معلومات إضافية، راجع قسم ارتداء الجميع للكمامة أدناه).

- سيرتدي السائقون/ المراقبون الكمادات في كل الأوقات.
- يجب أن يرتدي الركابون من سن عامين فأكبر كمامة وفقاً لبروتوكولات البرنامج.

التهووية

- ستظل النوافذ مفتوحة في الحافلة، أينما ومتى كان ذلك آمناً. لن تتم إعادة تدوير الهواء.

النظافة العامة

- سيحتفظ السائقون/ المراقبون بكمية كافية من المناديل ومعقمات اليد والكمادات ومستلزمات التنظيف وأكياس القمامة داخل المركبة في كل الأوقات.
- سيتم تفريغ القمامة وتنظيف الجزء الداخلي للحافلة وكنسه يوميًا.
- سيتم تطهير الجزء الداخلي مرة واحدة على الأقل كل يوم باستخدام منتج معتمد من وكالة حماية البيئة (EPA) للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2 على جميع الأسطح التي يكثر لمسها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأزرار ومقابض اليد ومقابض الأبواب ومقابض ناقل الحركة وأزرار التحكم في لوحة القيادة وأسلاك السحب والقضبان وعجلات القيادة والحواس. إذا كانت الأسطح المسامية اللينة متسخة بشكل واضح، فيجب تنظيفها باستخدام المنظفات المناسبة ثم تطهيرها باستخدام منتجات مضادة للميكروبات معتمدة من وكالة حماية البيئة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2
- يجب عدم استخدام المبيض مطلقاً على الأسطح القماشية، مثل أحزمة المقاعد، فقد يؤدي ذلك إلى تلف القماش.

تقليل المخالطة بين المجموعات

- قلل برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر ساعات الرعاية في بيئات اليوم الكامل إلى 8 ساعات في اليوم من أجل إبقاء الأطفال في مجموعات في كل فصل دراسي ولتجنب الجمع بين الفصول الدراسية في بداية ونهاية اليوم قدر المستطاع.
- إذا كان هناك سبب لخلط المجموعات، فسيتم تقييم ذلك على أساس كل حالة على حدة.
- لا تدخل الأسر في الوقت الحالي المبني ما لم يكن لديهم موعد محدد. إذا كان أولياء الأمور مهتمين بالتطوع، فسوف يحتاجون إلى اتباع إجراءات منظمة CAPV/ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للتطوع واتباع إرشادات كوفيد الفدرالية والولاية، بما في ذلك التلقيح الإلزامي.
- سيتم تقييم القيام برحلات ميدانية على أساس كل حالة على حدة، بالتشاور مع المشرفين. مسموح بالتنزه سيرًا على الأقدام في الحي.

الممارسات اليومية

- سيقوم برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بإعداد بيئات الفصل الدراسي لتعزيز التباعد البدني حسب الحاجة.
 - التباعد البدني غير مناسب للرضع والدارجين.
- سيتم إيقاف وجبات "النمط العائلي" في الوقت الحالي وسيقدم الموظفون الطعام للأطفال على أطباقهم الخاصة بدلاً من الممارسة المعتادة لدينا وهي "النمط العائلي".
- اتباع إجراءات غسل اليدين الخاصة ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر.
- يجب مراعاة غسل الأغراض اللينة بعناية في حالة ملامستهم للإفرازات الجسدية.
- سيتم إيقاف تفريش الأسنان مؤقتًا أثناء الوجود في الرعاية. وسندعم الأسر عن طريق إرسال معلومات حول رعاية الأسنان وأدوات تفريش الأسنان إلى المنزل.
- سيزيد المعلمون من الوقت الذي يقضونه في الهواء الطلق مع الأطفال، إذا سمح الطقس بذلك.

خدمات الدعم المباشر والمتطوعون (IFSP / IEP) والأخصائيون والمتعاقدون ومقدمو الخدمات الخارجيون والمتطوعون

- سيتعاون برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر مع برنامج التدخل المبكر أو وكالة التعليم المحلية لتسهيل تقديم الخدمات للأطفال الذين لديهم برنامج تعليم فردي (IEP) أو الخطة الفردية لخدمات الأسرة (IFSP).
- إذا تم تقديم الخدمات لطفل في المكان عن بعد (مثل الرعاية الصحية عن بُعد)، فسنستخدم غرفة منفصلة أو الفصل الدراسي الخاص بالطفل مع توفير المعدات المناسبة.
- إذا تم تقديم خدمات مباشرة في المكان، فسوف يتبع الشخص بروتوكولات CAPV الخاصة بالتلقيح وارتداء الكمامة طوال الوقت وغسل اليدين.
 - تتطلب OHS من الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين الذين تتضمن أنشطتهم الاختلاط بالأطفال والأسر أو تقديم خدمات مباشرة لهم بالحصول على اللقاح.

اللقاح المتطلبات والاستثناءات للموظفين

- يرجى الرجوع إلى [سياسة التلقيح الخاصة بمنظمة CAPV](#).

معدات الحماية الشخصية وممارسات التنظيف لتقليل انتشار كوفيد-19

ارتداء الجميع للكمامة

- الموظفون: يرجى الاطلاع على [بروتوكول معدات الحماية الشخصية الخاص بمنظمة CAPV](#)
 - مسموح لموظفي وأطفال برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر بإزالة الكمامات أثناء وجودهم بالخارج في الملعب إذا لم يكونوا في مكان خارجي مزدحم أو أثناء الأنشطة التي تنطوي على مخالطة مباشرة مستمرة مع أشخاص آخرين.
 - سيكون لدى الموظفون والأطفال دائمًا كمامات متاحة في الأماكن الخارجية في حالة الحاجة إليها.
 - الكمامات مطلوبة بالنسبة للموظفين وأولياء الأمور أثناء دخول الأطفال إلى الرعاية ومغادرتهم منها (الاستلام/ التوصيل).
- الأطفال: يجب على الأطفال من سن عامين فأكثر ارتداء كمامة في الداخل. يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين عدم ارتداء كمامة.

- استثناءات ارتداء الكمامات هي عندما يأكل الأطفال أو يشربون أو يأخذون قيلولاً؛ أو المجموعة الفرعية المحدودة من الأفراد الذين لا يستطيعون ارتداء الكمامة بأمان بسبب إعاقة على النحو المحدد في قانون الأمريكيين من ذوي الإعاقة (ADA)، بما يتفق مع توجيهات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بشأن استثناءات الإعاقة؛ أو عندما ينصح مقدم الرعاية الصحية الخاص بالطفل بغطاء وجه بديل لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الخاصة للطفل.
- قد يكون هناك أوقات قد يتعرض فيها الطفل لمخاطر تتعلق بالسلامة عند ارتداء كمامة. في هذه الحالات، يتم أخذ صحة وسلامة الطفل في الاعتبار، ويسمح بإزالة الكمامة في وقت وجود خطر على السلامة.
- تشمل الأمثلة: الأطفال الذين لا يستطيعون التعامل مع الكمامات بأمان، ومن يجدون صعوبة في التنفس، ومن يعانون من مشكلة في الإدراك أو الجهاز التنفسي، والأطفال الذين قد تعرضهم الكمامة لخطر الخنق أو الاختناق.
- مثل كل المهارات الجديدة، سيحتاج الأطفال إلى تعلم الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة والحفاظ عليها على الوجه. في حين أن الأطفال قابلون للتكيف، إلا أنهم لا يزالون في المراحل الأولى من نموهم وقد يحتاجون إلى تذكيرات وتعزيزات للامتثال لهذه الممارسة الجديدة.
- **الأسر:** من المتوقع أن يرتدي مقدمو الرعاية الذين يقومون بتوصيل الأطفال أو استلامهم أو القدوم إلى أماكن البرنامج لأي سبب آخر كمامة أو غطاء وجه قماشي. سيقدم الموظفون لمقدم الرعاية كمامة إذا لم يكن لديه واحدة.
- **ارتداء الكمامة:** يجب أن تغطي الكمامة الفم والأنف والذقن. يمكن أن تثبت حول الأذنين أو مؤخرة الرأس، طالما أنها تظل في مكانها عندما يتحدث المرء ويتحرك. لا يُسمح باستخدام الكمامات ذات فتحات التهوية أو صمامات الزفير لأنها تتيح خروج النفس غير المرشح من الكمامة (يمكن ارتداء كمامة جراحية فوق الصمام).

واقيات الوجه: سيتم ارتداء واقيات الوجه والكمامات عند استخدام أجهزة البخاخات.

القفازات: اتبع الاحتياطات العامة وارتدِ القفازات عند تغيير الحفاضات وإعطاء الأدوية ووضع واقى الشمس والتعامل مع الطعام والتعامل مع النفايات وسوائل الجسم والتنظيف.

غسل اليدين: يجب على الأفراد الذين يدخلون المبنى وليس الفصل الدراسي استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على 60% كحول وأكثر والموضوعة في جميع أنحاء المبنى أو غسل أيديهم في أي حوض لغسل اليدين متاح. يجب على أي فرد يدخل الفصل الدراسي أن يغسل يديه بالماء والصابون ويفركهما لمدة 20 ثانية أو أكثر عند الدخول؛ وعند القدوم من أنشطة خارجية؛ وقبل الأكل وبعده؛ وبعد العطس أو السعال أو تنظيف الأنف؛ وبعد استخدام المراحيض وتغيير الحفاضات؛ وقبل التعامل مع الطعام؛ وبعد لمس أو تنظيف الأسطح التي قد تكون ملوثة؛ وبعد مساعدة الأطفال في غسل اليدين؛ وقبل إعطاء الدواء وبعده؛ وقبل دخول المركبات المستخدمة لنقل الأطفال؛ وقبل/بعد تغيير القفازات.

التنظيف:

- يجب على المعلمين تنظيف المناطق التي يكثر لمسها بمعدل مرة واحدة يوميًا على الأقل (ولا بأس في التنظيف مرات أكثر)
- يمكن للأطفال مشاركة الأشياء (لا حاجة للتعقيم بين استخدام كل طفل)
- سيقوم الطهاة بتنظيف المطابخ طوال اليوم حسب الحاجة
- سينظف القائمون بأعمال النظافة الفصول الدراسية وأرضيات المطابخ والحمامات وخلافه جيدًا في المساء
- يتم تنظيف جميع مناطق المبنى الأخرى وفقًا لجدول زمني روتيني، بما في ذلك حمامات البالغين والمناطق المشتركة

معقم ومطهر Force of Nature: اتبع تعليمات الشركة المصنعة عند خلط المنتج. ضع ماصقًا على الزجاجة (على شريط أو ملصق قابل للإزالة) مدون عليه التاريخ حتى يعرف الموظفون أنه يجب التخلص من المحلول بعد مرور أسبوعين وخلط زجاجة جديدة. يجب أن يبقى Force of Nature على السطح لمدة 10 دقائق حتى يكون فعالاً. يخضع Force of Nature لاختبارات سلامة مكثفة وتظهر الدراسات أنه آمن للاستخدام كمعقم.

المبيض (معقم أو مطهر حسب المحلول). يجب أن يبقى المبيض على السطح لمدة دقيقة واحدة.
المبيض كمطهر

5%-6% مبيض	8%-9% مبيض
4 معالق صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ملعقتان كبيرتان لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة
ثلاث كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	نصف كوب لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

المبيض كمعقم

5%-6% مبيض	8%-9% مبيض
نصف ملعقة صغيرة لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من المبيض لكل ربع جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة
ملعقتان صغيرتان لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة	ملعقة كبيرة من المبيض لكل جالون من الماء بدرجة حرارة الغرفة

سلامة الطعام: سيتم اتباع لوائح CACFP و EEC لإعداد جميع الوجبات الرئيسية والخفيفة.

عمليات التوصيل من الموردين: كلما كان ذلك ممكنًا، سيتم إجراء عمليات التوصيل إلى المواقع بدون تلامس. في حالة إحضار شحنات إلى داخل المبنى (مثل الطعام)، يجب على الشخص الذي يقوم بالتوصيل ارتداء كمامة عند الوصول. إذا لم يكن لديه كمامة، سيتم توفير واحدة له.

رعاية الرضع والدارجين وصغار الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة:

- **غيار الحفاضات:** اتبع إجراءات غيار الحفاضات الخاصة بالمؤسسة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (NAEYC) وبرنامج HSELP.
- **التغذية:** اتبع ممارسات التغذية الخاصة ببرنامج HSELP.

التهوية: من أجل زيادة الوصول إلى الهواء النقي في الداخل، يجب إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة عندما لا تكون درجة الحرارة ساخنة/ باردة بشكل غير مريح وعندما لا يشكل ذلك خطرًا على السلامة. يجب أن تشمل نوافذ الطابق الثاني على آلية أمان. يمكن استخدام مكيفات الهواء، ويمكن أن تعمل في وضع "المروحة" لتحريك/ ترشيح الهواء كبديل لإنتاج هواء بارد إذا كان ذلك أكثر ملاءمة. تحتوي الفصول الدراسية والمساحات المكتبية المشتركة المستخدمة على أجهزة تنقية الهواء. يتم تنظيف جميع فلاتر الهواء واستبدالها على أساس روتيني كما هو موضح بالمعدات المستخدمة.

إعطاء الأدوية

الحالة الطبية	الأدوية المطلوبة	التدابير الوقائية لكوفيد-19
الربو	يوصى باستخدام أجهزة الاستنشاق ذات الجرعات المحددة أو البخاخات عند الضرورة القصوى.	يوصى باستخدام أجهزة الاستنشاق ذات الجرعات المحددة مع وجود أدوات مباحة. لن يتم استخدام البخاخات إلا عند الضرورة القصوى، وعلى أساس كل حالة على حدة. إذا لم تتمكن الأسر من توفير أدوات مباحة، سيوفرها البرنامج. سيرتدي الموظفون كمامة جراحية وقفازات وواقي للوجه عند استخدام البخاخات. سيقوم الموظفون بإعطاء الأدوية في مكان بعيد عن الأطفال أو في غرفة منفصلة ما لم يكن ذلك مهددًا للحياة.
الحساسية	الأدوية عن طريق الفم أو حاقن إبينفرين الآلي للطفل المصاب بالحساسية حسب توجيهات الطبيب	سيرتدي الموظفون كمامة جراحية موسى بها وقفازات.
الاضطرابات التنشجية	الأدوية عن طريق الفم أو المستقيم حسب توجيهات الطبيب	سيرتدي الموظفون كمامة جراحية موسى بها وقفازات.
حالة طبية حادة	الأدوية عن طريق الفم أو الأدوية الموضعية حسب توجيهات الطبيب	سيرتدي الموظفون كمامة جراحية موسى بها وقفازات.

عند إصابة أحد الأشخاص بالمرض

المرض المؤكد في المكان

إذا علم أحد الموظفين بحالة تعرض لمرض معد (بما في ذلك كوفيد-19)، فسيبلغ الموظف مشرفه على الفور، والذي سيتشاور مع أخصائي الصحة/ مدير الصحة لدينا. سيتبع برنامج هيد ستارت والتعليم المكبر الإجراءات الحالية للتواصل مع الأسر حول وجود حالة مرضية في البرنامج.

إذا ظهرت أعراض على طفل و/أو جاءت نتيجة فحصه إيجابية و/أو تعرض لكوفيد-19

إذا ظهرت أعراض على طفل	
سيستظر الطفل في غرفة العزل مع شخص بالغ معتمد يرتدي معدات الحماية الشخصية	← شجع الطفل الذي تظهر عليه الأعراض على ارتداء كمامة (إذا كان في عمر عامين وأكبر) أثناء وجوده في غرفة العزل
اتصل بولي الأمر أو الوصي ورتب عودة الطفل إلى المنزل أو يمكن إجراء فحص للطفل من قبل موظفي برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر إذا تم منح موافقة ولي الأمر	← إذا اصطحب ولي الأمر الطفل. زود ولي الأمر بفحص مستضد سريع (للأطفال في عمر عامين وأكبر) إذا تم الحصول على موافقة ولي الأمر المناسبة لإجراء الفحص عند اصطحاب الطفل أو سلمه له لإجراء الفحص في المنزل
	← إذا تم فحص الطفل من قبل أحد موظفي برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر وكانت نتيجته سلبية مع وجود أعراض خفيفة (راجع العناصر غير المكتوبة بخط غامق أدناه)، يمكن للطفل البقاء. إذا كانت نتيجة فحص الطفل إيجابية، فاتبع الخطوات أدناه.
أبلغ ولي الأمر ليخضع طفله لفحص كوفيد إذا لم يكن مشاركًا في خيار الفحص والبقاء أو إذا تعرض الطفل للمرض خارج المدرسة (ملاحظة: ينطبق ذلك أيضًا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين لأنهم لا يستطيعون المشاركة في خيار الفحص والبقاء بسبب العمر)	← يمكن للأسر أيضًا الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لأطفالهم لإجراء مزيد من التقييم
	← سيوفر البرنامج فحص مستضد سريع (لمن هم في عمر عامين وأكبر) كما هو متاح بموافقة الأسر
	← ملاحظة: لا يمكننا توفير فحوصات المستضدات السريعة للأطفال دون سن الثانية
سيقوم الموظفون بتنظيف وتطهير وتهوية المناطق التي يشغلها الطفل المريض.	
إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يمكن للطفل البقاء في الرعاية إذا كانت الأعراض خفيفة أو يعود إلى الرعاية بمجرد أن يكون خاليًا من الحمى لمدة 24 ساعة وتحسنت أعراضه.	

إذا كانت نتيجة فحص كوفيد-19 للطفل إيجابية (العزل)

سيظل الطفل في المنزل لمدة 5 أيام	
بعد 5 أيام	← إذا كان قادرًا على ارتداء كمامة باستمرار أثناء وجوده في الرعاية، يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم السادس (يوصى بإجراء فحص تفاعل البلمرة السلسلي (PCR) أو المستضد، ولكن ليس إلزامي)
	← إذا كان الطفل يعاني من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليه أعراض، يمكنه العودة إلى الرعاية، ولكن إذا لم تتحسن الأعراض، فيجب أن يظل خارج الرعاية حتى تتحسن الأعراض ويتحقق مع أخصائي الصحة في برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر للاستشارة حسب الحاجة

يجب أن يكون الأطفال بدون حمى لمدة 24 ساعة قبل العودة إلى الرعاية وأن يكونوا قادرين على اجتياز الفحص الصحي اليومي		
يمكن للطفل إجراء فحص (PCR أو المستضد) في اليوم الخامس أو بعده:	←	إذا كان الطفل لا يمكنه ارتداء كمامة باستمرار أثناء وجوده في الرعاية
<ul style="list-style-type: none"> إذا كانت نتيجة الفحص سلبية (PCR أو المستضد) ولا تظهر على الطفل أعراض أو أصبحت أخف: يمكنه العودة إلى الرعاية في اليوم التالي لظهور نتيجة الفحص السلبية، والعودة في موعد لا يتجاوز اليوم 11 إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، يواصل العزل حتى تصبح نتيجة الفحص سلبية أو اختفاء الأعراض أو تراجعها حتى اليوم العاشر، ويعود في موعد لا يتجاوز اليوم 11 		
يظل في المنزل لمدة 10 أيام ويعود في اليوم 11	←	إذا كان الطفل لا يمكنه إجراء فحص (PCR أو المستضد)

إذا تعرض الطفل لشخص مصاب بمرض كوفيد-19		
سيظل الطفل في المنزل لمدة 5 أيام أو		
سيوفر برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر فحوصات المستضدات السريعة مع وجود الموافقة المناسبة يوميًا للأسر لمدة 5 أيام متتالية للأطفال بعمر عامين وأكبر	←	إذا حدث التعرض في موقع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر وكان الطفل بدون أعراض واجتاز الفحص الصحي اليومي
سيكون ولي الأمر عندئذ مسؤولاً عن استخدام موارده الخاصة (في بعض الحالات، قد يكون لدى برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر فحوصات متاحة من مصادر غير تابعة لوزارة (EEC) اتبع ما ذكر أعلاه في "إذا ظهرت أعراض"	←	إذا لم يحدث التعرض في موقع برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر
	←	إذا تعرض الطفل وظهرت عليه أعراض
ملاحظة: بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية، سيتم اتباع إرشادات العزل الموضحة أعلاه		
عندما يظل الطفل في المنزل لمدة 5 أيام		
إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية، يمكن للطفل العودة إلى الرعاية	←	إجراء فحص (PCR أو المستضد) في اليوم الخامس أو السادس أو السابع
إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية، اتبع إرشادات العزل الموضحة أعلاه	←	
يظل في المنزل لمدة 10 أيام كاملة ويعود في اليوم 11	←	إذا كان الطفل لا يمكنه إجراء فحص (PCR أو المستضد)

إذا حصل الطفل على اللقاح أو أصيب بمرض كوفيد-19 خلال الـ 90 يومًا الماضية		
إذا كان الطفل قد أصيب بكوفيد-19 خلال الـ 90 يومًا الماضية، يمكنه التواجد في الرعاية ويتم إعفاؤه من الحجر الصحي وإجراء الفحص		
إذا حصل الطفل على اللقاح كاملاً، اتبع ما ذكر أعلاه عند التعرض أو ظهور أعراض		

السفر للأطفال

- إذا لم يكن الطفل "محدثاً" بكافة جرعات لقاح كوفيد-19 المطلوبة أو لم يحصل على اللقاح:
 - عند العودة: الخضوع للحجر الصحي والفحص (PCR) بعد 3-5 أيام من العودة والبقاء في المنزل والحجر الذاتي لمدة 5 أيام كاملة بعد السفر.
- يرجى اتباع [بروتوكول السفر الخاص بمنظمة CAPV](#)

عودة الموظفين إلى العمل

سيستبع الموظفون بروتوكولات منظمة CAPV. يرجى الاطلاع على بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بمنظمة CAPV.

موارد برنامج HSELP الإضافية في حالة المرض (الموظفون/الأطفال)

للحصول على قائمة كاملة بالأمراض ومتى ينبغي البقاء في المنزل، راجع [سياسات وإجراءات كتيب أولياء الأمور الخاص ببرنامج هيد ستارت والتعليم المبكر](#).

أسباب تتعلق بكوفيد-19

- يجب أن يبقى الطفل في المنزل للأسباب التالية:
 - إذا كانت درجة حرارة الطفل 100.0 أو أعلى.
 - إذا ظهر على الطفل أعراض كوفيد-19 أو أعراض تشبه الأنفلونزا أو كان يعاني من سعال أو ضيق النفس أو صعوبة في التنفس.
 - فقدان مستجد لحاسة التذوق أو الشم
 - آلام في العضلات أو آلام في الجسم
 - إذا كان الطفل يعاني من عرضين أو أكثر من الأعراض التالية، والتي لا علاقة لها بمشكلة صحية مزمنة: سعال أو حمى أو شعور بالحمى والقشعريرة أو صداع أو ألم عضلي أو قيء أو إسهال أو التهاب في الحلق أو تعب أو احتقان بالأنف أو سيلان بالأنف غير ناتج عن أسباب أخرى معروفة، مثل الحساسية
 - العناصر بخط غامق أدناه تتطلب استبعادًا فوريًا من الرعاية:
 - حمى تبلغ 100 درجة فهرنهايت أو أكثر، أو قشعريرة
 - صعوبة في التنفس أو ضيق النفس
 - فقدان مستجد لحاسة التذوق أو الشم
 - آلام في العضلات أو آلام في الجسم
- يجب التعامل مع العناصر غير المكتوبة بخط غامق على أساس كل حالة على حدة اعتمادًا على شدتها ومجموعة الأعراض وسياسات مرض الأطفال الخاصة بالبرنامج.
 - سعال (ليس نتيجة أسباب أخرى معروفة مثل السعال المزمن)
 - التهاب الحلق عند مصاحبته لأعراض أخرى
 - غثيان أو تقيؤ أو إسهال عند مصاحبته لأعراض أخرى
 - صداع عند مصاحبته لأعراض أخرى
 - إعياء عند مصاحبته لأعراض أخرى
 - احتقان أنفي أو سيلان في الأنف (ليس نتيجة أسباب أخرى معروفة، مثل أنواع الحساسية) عند مصاحبته لأعراض أخرى

*ملاحظة: المخالط المباشر وفقًا لمركز CDC يعني:

*شخص كان في نطاق 6 أقدام من شخص مصاب (تأكدت إصابته مختبريًا أو بتشخيص سريري) لمدة إجمالية تراكمية تبلغ 15 دقيقة أو أكثر خلال فترة 24 ساعة (على سبيل المثال، ثلاث مرات تعرض فردية لمدة 5 دقائق بإجمالي 15 دقيقة في يوم واحد). يمكن لأي شخص مصاب أن ينشر فيروس SARS-CoV-2 بدءًا من يومين قبل ظهور أي أعراض عليه (أو بالنسبة للمرضى الذين لا يعانون من أعراض، قبل يومين من تاريخ جمع العينة الإيجابية)، حتى يستوفي معايير إيقاف العزل المنزلي. الأشخاص الذين تعرضوا لشخص مصاب بكوفيد-19 بعد أن أكمل الشخص المصاب ما لا يقل عن 5 أيام من العزل لا يعتبرون مخالطين مباشرين.

**ملاحظة: حصل على اللقاح كاملاً وفقًا لمركز CDC يعني:

- شخص تلقى سلسلته الأولية من لقاحات كوفيد-19.
- بعد أسبوعين من حصوله على الجرعة الثانية في سلسلة من جرعتين، مثل لقاح فايزر أو مودرنا، أو
- بعد أسبوعين من حصوله على لقاح من جرعة واحدة، مثل لقاح جانسن من جونسون أند جونسون

**ملاحظة: "محدث" يعني:

- عندما يتلقى الشخص جميع لقاحات كوفيد-19 الموصى بها، بما في ذلك أي جرعة (جرعات) معززة عندما يكون مؤهلاً لها.

حالات إغلاق البرنامج المتوقعة

- سيبلغ مشرفو التعليم أو مدير التعليم أو من ينوب عنه عن إغلاق البرنامج إلى EEC وسيبلغ مدير البرنامج أو من ينوب عنه المكتب الإقليمي لبرنامج هيد ستارت.
- سيبلغ الأسر مناصر الأسرة أو مدير الموقع أو من ينوب عنه.
- سيبلغ الموظفين مشرفوهم أو من ينوب عنهم.
- راجع خطط طوارئ برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر لحالات إغلاق البرنامج.

الإشعارات وإشراك مجلس الصحة المحلي

- سيتبع البرنامج جميع بروتوكولات برنامج هيد ستارت والتعليم المبكر / CAPV المعمول بها. إذا ظهرت حالة تحتاج إلى مزيد من التوجيه، فسيقوم أحد أعضاء الفريق الصحي بالاتصال بمجلس الصحة المحلي للحصول على مزيد من التوجيه.

الموارد

لوائح وزارة EEC:

<https://www.mass.gov/doc/606-cmr-700-regulations-for-family-group-school-age-child-care-programs/download>

توجيهات الصحة والسلامة الخاصة بوزارة EEC:

<https://www.mass.gov/service-details/eecs-health-and-safety-guidance-during-covid-19-recovery-for-child-care-providers>

موارد مكتب برامج هيد ستارت:

- [متطلبات اللقاح والكمادات للتخفيف من انتشار كوفيد-19 في برامج هيد ستارت](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs)
- [تمهيد للقاعدة النهائية بشأن متطلبات اللقاح والكمادات](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preamble-final-rule-vaccine-mask-requirements)
- [معايير أداء برامج هيد ستارت المنقحة بشأن تلقيح الموظفين وقاعدة ارتداء الجميع للكمادة](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/revised-head-start-program-performance-standards-staff-vaccination-universal-masking)
- [ملخص متطلبات اللقاح والكمادات للتخفيف من انتشار كوفيد-19 في برامج هيد ستارت](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/summary-vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs)
- [الأسئلة الشائعة حول متطلبات ارتداء الجميع للكمادة ولقاح كوفيد-19](https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/universal-masking-covid-19-vaccine-requirement-faqs)

توجيه CDC:

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html>